



THE POWER TO PERFORM



Fertilization plan
Coco cultivation



Bemestingsschema
Kokos



Plan de fertilización
para cultivo en Coco

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



Coco Forte A + Coco Forte B = Total EC**

ML / 10 LTR

	Coco Forte A	Coco Forte B	Total EC**	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Periodo de crecimiento	9	9	1,0	8	5	6	7	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	13	13	1,4	7	5	6	7	-	2
	16	16	1,7	5	8	6	7	-	2
	18	18	1,9	-	8	6	7	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	18	18	1,9	-	10	6	7	-	2
	18	18	1,9	-	10	6	7	4	2
	18	18	1,9	-	10	6	7	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	16	16	1,7	-	10	6	7	8	2
	<13	<13	1,4	-	10	6	7	10	2
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la ultima semana	-	-	-	-	-	-	7	8	-



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips Coco

- When using Coco Forte A+B: first mix A in the vessel, then mix in B.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 5.5 - 6.5$.
- For the best results we recommend to use our Cocomix Plus or Coco Bricks.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml./10 liters) and MgO 10 (± 4 ml./10 liters) to the fertilizer mix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.

** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.



Autoflower Supermix

Tips Kokos

- Bij gebruik Coco Forte A+B: eerst A mengen, daarna B erbij mengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulators mengen.
- pH stellen naar $\pm 5.5 - 6.5$.
- Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Cocomix Plus of Coco Bricks te gebruiken.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml./10 liter) en MgO 10 (± 4 ml./10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- De dosering van de hoofdmeststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.

** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos Coco

- Cuando use Coco Forte A + B: primero mezcle A en el tanque, luego agregue y mezcle B.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 5.5 - 6.5$.
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Cocomix Plus o Coco Bricks.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) y MgO 10 (± 4 ml./10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
- Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.

** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.

